

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「タカタ」 56噴霧用・120噴霧用を使用されている方へ

◆お薬を正しくご使用いただくために以下の事項をお守りください。

- 医師に指示された用法・用量を守って使用してください。
- 鼻腔内噴霧用にのみ使用してください。
- 1容器中の噴霧回数(56回または120回)を超えて噴霧しないでください。
- **噴霧口を針などで突くことはしないでください。**
破損し、噴霧できなくなります。


お薬の使用方法

点鼻をする前に、鼻をかんで、鼻の通りを良くしてください。




↓

噴霧器のキャップをした状態で、**上下によく振ってください。**内容液が均一になります。



↓

キャップはまっすぐ上に外してください。
※キャップはひねらないでください。



↓

噴霧時は、イラストのように容器を斜めに傾けず、立てた状態でしっかりと持ってください。
※初回使用時のみ、噴霧口を上に向け、**空打ちを10回程度行ってください。**
お薬が霧状に噴霧されることを確認してから使用してください。



お薬の使用方法（裏面）に続きます

お薬の使用方法（裏面）

15歳以上（1日1回左右 **2** 噴霧ずつ）



少し頭をうつむいた状態で、噴霧口を左右の鼻腔に入れ、1回ずつ噴霧してください。



お薬を噴霧後、顔を上に向けながら鼻の奥までお薬が行き渡るように、鼻から息を吸って口から吐ってください。



再び少し頭をうつむいた状態で、噴霧口を左右の鼻腔に入れ、1回ずつ噴霧してください。



お薬を噴霧後、顔を上に向けながら鼻の奥までお薬が行き渡るように、鼻から息を吸って口から吐ってください。

15歳未満（1日1回左右 **1** 噴霧ずつ）



少し頭をうつむいた状態で、噴霧口を左右の鼻腔に入れ、1回ずつ噴霧してください。

保護者が行う場合



上のイラストのように噴霧してください。



お薬を噴霧後、顔を上に向けながら鼻の奥までお薬が行き渡るように、鼻から息を吸って口から吐ってください。

「使用方法に関する動画」は
右の二次元コードからご覧
いただけます。



噴霧後のお手入れと保管方法について

- 使用後は噴霧口をティッシュなどで拭いてから、キャップをしてください。
- 直射日光を避けて、保存袋に入れて室温で保管してください。