

報道関係者各位

平成 25 年 9 月 3 日  
高田製薬株式会社

持続性選択H<sub>1</sub>受容体拮抗・抗アレルギー性疾患治療剤  
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」およびセチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」  
小児適応の追加承認取得のお知らせ

---

高田製薬株式会社（本社／東京都、社長／高田浩樹）は、平成 25 年 9 月 2 日にH<sub>1</sub>受容体拮抗・抗アレルギー性疾患治療剤のセチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」およびセチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」の小児への効能・効果および用法・用量の追加承認を取得しましたのでお知らせします。

この度の小児への効能・効果および用法・用量の追加承認取得に関しては、5mg 錠は複数社あるものの1.25%ドライシロップ剤は弊社だけであり、ジェネリック医薬品を希望する患者さんのお役に立てるものと考えています。

以上

（お問合せ先）  
高田製薬株式会社  
広報担当 大坂谷まで  
TEL 048 - 622 - 8950  
FAX 048 - 623 - 3065  
携帯 090 - 1842 - 9589

## 参考

今回、承認取得した効能・効果および用法・用量は下線部の通りです。

### 【効能・効果】

〔成人〕アレルギー性鼻炎

蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚掻痒症

〔小児〕アレルギー性鼻炎

蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症）に伴う掻痒

### 【用法・用量】

- ・ セチリジン塩酸塩D S 1.25%「タカタ」

〔成人〕通常、成人には1回0.8g（セチリジン塩酸塩として10mg）を1日1回、就寝前に用時懸濁して経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日1.6g（セチリジン塩酸塩として20mg）とする。

〔小児〕通常、2歳以上7歳未満の小児には1回0.2g（セチリジン塩酸塩として2.5mg）を1日2回、朝食後及び就寝前に用時懸濁して経口投与する。

通常、7歳以上15歳未満の小児には1回0.4g（セチリジン塩酸塩として5mg）を1日2回、朝食後及び就寝前に用時懸濁して経口投与する。

- ・ セチリジン塩酸塩錠5mg

〔成人〕通常、成人にはセチリジン塩酸塩として1回10mgを1日1回、就寝前に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日20mgとする。

〔小児〕通常、7歳以上15歳未満の小児にはセチリジン塩酸塩として1回5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与する。