

2019年5月22日

報道関係者各位

高田製薬株式会社

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg/10mg 「タカタ」

ロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg 「タカタ」

効能・効果 および 用法・用量の追加承認を取得

高田製薬株式会社（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：高田浩樹）は、2019年5月22日にロスバスタチン錠 2.5mg/5mg/10mg 「タカタ」、ロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg 「タカタ」について、下記「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得しましたことをお知らせいたします。

この承認により、先発医薬品の適応と同一となり、先発医薬品と同様に使用していただけるようになります。当社は、患者さんや医療関係者の皆さんの声に耳を傾け、ニーズに合った医薬品を提供することにより、医療に貢献してまいります。

記

製品名	ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg/10mg 「タカタ」 ロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg 「タカタ」
効能・効果 (下線部分を追加)	高コレステロール血症、 <u>家族性高コレステロール血症</u>
用法・用量 (下線部分を追加)	通常、成人にはロスバスタチンとして 1 日 1 回 2.5mg より投与を開始するが、早期に LDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には 5mg より投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4 週以降に LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次 10mg まで増量できる。10mg を投与しても LDL-コレステロール値の低下が十分でない、 <u>家族性高コレステロール血症患者などの重症患者</u> に限り、さらに増量できるが、1 日最大 20mg までとする。

以上

【お問い合わせ先】

高田製薬株式会社 経営企画部 広報課  
TEL:048-816-4166 / FAX:048-816-4192  
E-mail:koho@takata-seiyaku.co.jp