

2019年11月13日

報道関係者各位

高田製薬株式会社

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

ピタバスタチン Ca 錠 1mg 「タカタ」

ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「タカタ」

用法・用量の追加承認を取得

高田製薬株式会社（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：高田浩樹）は、2019年11月13日にピタバスタチン Ca 錠 1mg 「タカタ」、ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「タカタ」について、下記「用法・用量」の追加承認を取得しましたことをお知らせいたします。

この承認により、先発医薬品と同様に使用していただけるようになりました。

当社は、患者さんや医療関係者の皆さんの声に耳を傾け、ニーズに合った医薬品を提供することにより、医療に貢献してまいります。

記

製品名	ピタバスタチン Ca 錠 1mg 「タカタ」 ピタバスタチン Ca 錠 2mg 「タカタ」
用法・用量 (下線部分を追加)	<p><u>高コレステロール血症</u> 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL - コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p> <p><u>家族性高コレステロール血症</u> <u>成人</u>：通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL - コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。 <u>小児</u>：通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。 なお、症状により適宜増減し、LDL - コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。</p>

以上

【お問い合わせ先】

高田製薬株式会社 人事総務部 CSR推進課

TEL:048-816-4166 / FAX:048-816-4173

E-mail:koho@takata-seiyaku.co.jp