

2021年6月23日

各位

高田製薬株式会社

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

デュロキセチンカプセル 20mg 「タカタ」

デュロキセチンカプセル 30mg 「タカタ」

効能・効果 および 用法・用量の追加承認を取得

高田製薬株式会社（埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長 高田浩樹）は、2021年6月23日にデュロキセチンカプセル 20mg「タカタ」、デュロキセチンカプセル 30mg「タカタ」について、下記「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得しましたことをお知らせいたします。

この承認により、先発医薬品と効能・効果および用法・用量が同一になりました。

当社は、患者さんや医療関係者の皆さんの声に耳を傾け、ニーズに合った医薬品を提供することにより、医療に貢献してまいります。

記

製品名	デュロキセチンカプセル 20mg 「タカタ」 デュロキセチンカプセル 30mg 「タカタ」
効能・効果 (下線部分を追加)	○うつ病・うつ状態 ○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症 <u>慢性腰痛症</u> <u>変形性関節症</u>
用法・用量 (下線部分を追加)	〈うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛〉 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして40mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。 なお、効果不十分な場合には、1日60mgまで増量することができる。 〈 <u>線維筋痛症に伴う疼痛、慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛</u> 〉 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。

以上

【お問い合わせ先】

高田製薬株式会社 人事総務部 総務課
TEL:048-816-4193 / FAX:048-816-4192
E-mail: soumu@takata-seiyaku.co.jp