

2021年12月15日

各位

高田製薬株式会社

選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI)  
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg 「タカタ」  
用法・用量の追加承認を取得

高田製薬株式会社（埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長 高田浩樹）は、2021年12月15日にフルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg 「タカタ」について、下記「用法・用量」の追加承認を取得しましたことをご知らせいたします。

この承認により、先発医薬品と用法・用量が同一になりました。

当社は、患者さんや医療関係者の皆さんの声に耳を傾け、ニーズに合った医薬品を提供することにより、医療に貢献してまいります。

## 記

製品名	フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg 「タカタ」
用法・用量 (下線部分を追加)	成人への投与： 〈うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害〉 通常、成人には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日50mgを初期用量とし、1日150mgまで増量し、1日2回に分割して経口投与する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。 <u>小児への投与：</u> <u>〈強迫性障害〉</u> <u>通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回25mgの就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔をあけて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として25mgずつ行うこと。</u>

以上

## 【お問い合わせ先】

高田製薬株式会社 人事総務部 総務課  
TEL:048-816-4193 / FAX:048-816-4192  
E-mail: soumu@takata-seiyaku.co.jp